Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: **-**
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Общая иммунология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Антинуклеарные антитела (ANA) к 17 антигенам:			
Нуклеосомы	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
Sm	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
Sm/RNP	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
Рибосомы	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
Гистоны	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
U1-snRNP	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
SS-A/Ro60	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
SS-A/Ro52	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
SS-B/La	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
Scl-70	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
PM-Scl	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
CENT-A/B	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
PCNA	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
Jo-1	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
Митохондрии (AMA-M2)	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
f-Актин	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
DFS-70	0.20	Ед/мл	0.00-0.99
Антитела к двуспиральной ДНК (dsDNA)	4.30	Ед/мл	0.00-20.00
Антинуклеарный фактор (АНФ) на Hep-2 IgG	1/160	**положительный**	
Референсные значения: <1/80 - отрицательный >=1/80 - положительный			
Тип свечения -Цитоплазматический (AC-15-23)			
Антинуклеарный фактор (АНФ) - группа антинуклеарных антител (АНА), определяемых методом непрямой иммунофлюоресценции (нРИФ). Данный метод обладает высокой чувствительностью и специфичностью в отношении ряда аутоиммунных ревматических заболеваний. Клиническое значение имеют титры АНФ 1:80 и выше, что может указывать на наличие аутоиммунного заболевания, либо риск его развития при отсутствии клинических проявлений. Ложноположительные результаты при невысоких титрах АНФ (до 1:320) определяются у клинически здоровых людей, у лиц пожилого возраста - до 10% случаев. Также возможно повышение титров АНФ на фоне приема лекарственных препаратов (лекарственная волчанка). Для подтверждения положительного результата используются тесты, предназначенные для выявления антител к индивидуальным антигенам (ИФА, Вестерн-блот, лайн-блот). Цитоплазматический тип свечения (AC-15-23 по номенклатуре ICAP*) определяется при наличии антител к актину, тРНК-синтетазам, в частности, Jo-1. Характерен для полимиозита, дерматомиозита, аутоиммунных заболеваний печени, первичного			

Пример результата

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: **-**
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Общая иммунология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
билиарного цирроза, системной красной волчанки (СКВ). *ICAP - Международный консенсус по паттернам антинуклеарных антител.			

Пример результата

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**