LAB4U
Лицензия Л041-01137-77/00383258 от 23.05.2013

BION
Клинико-диагностическая лаборатория
Лицензия № Л041-01162-50/00370168 от 06 июня 2019 г.

Ист.бол./Амб.карта:
Ф.И.О.: **Иванов Иван Иванович**
Дата рождения: **01/01/2000** Пол: **Мужской**

Адрес: **Москва**

Страховая компания:
Стр. полис: Серия Номер

ЛПУ: **(9777) Lab4u (Регионы)**
Отделение
Ф.И.О. врача: **-**
Дата/время взятия материала: **01/01/2026 08:30**
Дата доставки материала: **01/01/2026**
Номер заказа: **9770999999**
Номер образца: **9770999999**

Общая иммунология

Наименование теста	Результат	Единицы измерения	Референсные значения
Антитела к эндомизию класса IgA (АЭА)	титр <1:5 - отрицательный		
Антитела к эндомизию класса IgG (АЭА)	титр <1:5 - отрицательный		
Примечание: Антитела к эндомизию класса IgA не обнаружены, что с вероятностью 95-98% исключает диагноз целиакии, при условии наличия глютенсодержащих продуктов в рационе питания обследуемого (рекомендации Европейского общества педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и питания (ESPGHAN, 2019) и клинические рекомендации Союза педиатров России (2016)). При интерпретации результата данного теста необходимо учитывать общий уровень иммуноглобулина IgA в сыворотке крови, возраст пациента и прием иммуносупрессивных препаратов. У пациентов с низким уровнем IgA (<0,2 г/л) для диагностики целиакии рекомендуется определение антител класса IgG к тканевой трансглутаминазе 2. Основным антигеном антител к эндомизию является белок тканевая трансглутаминаза 2 типа. Она играет значительную роль в увеличении сродства глиадина (глютена) к молекулам HLA-DQ2/DQ8, что приводит к активации иммунитета и последующему повреждению эпителиоцитов слизистой оболочки кишечника, к продукции антител к глиадину, тканевой трансглутаминазе 2 и эндомизию, которые попадают в системную циркуляцию и могут быть выявлены при проведении серологического исследования. Отсутствие антител к эндомизию (АЭА) класса IgG снижает вероятность целиакии, при условии, что на момент обследования обследуемый не находился на безглютеновой диете т.е. получал обычную пищу богатую глиадином. Этот тест рекомендуется проводить при подозрении на селективный дефицит IgA, поскольку позволяет исключить целиакию у лиц с селективным иммунодефицитом IgA, у которых целиакия выявляется сравнительно часто.			

Пример результата

Иванов И.И.,

Дата выдачи: **04/04/2024**